

## MÉTADONNÉES

### Aires de drainage des stations d'échantillonnage du benthos

#### Description

Cette thématique regroupe certaines aires de drainage de stations d'échantillonnage du benthos qui ont été créées pour répondre à des besoins spécifiques.

L'aire de drainage représente le territoire dont les eaux se déversent vers la station d'échantillonnage. Les limites sont générées à l'aide d'un système d'information géographique (SIG) à partir des cartes topographiques, de modèles numériques d'élévation et de modèles d'écoulement et des limites de bassins existants.

L'aire de drainage sert à calculer la superficie drainée en amont de la station d'échantillonnage, à caractériser le territoire drainé (utilisation du territoire, etc.) et à répondre à des besoins spécifiques de cartographie.

La table attributaire des aires de drainage fourni également la compilation de l'utilisation du territoire par catégorie pour la dernière année disponible au moment de la production de la donnée. À noter que l'utilisation du territoire hors Québec des aires de drainage transfrontalières est inconnue et que les pourcentages de chaque catégorie correspondent à la superficie québécoise seulement.

#### Référence à citer

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), 2023. Aires de drainage des stations d'échantillonnage du benthos, Québec, Direction générale du suivi de l'état de l'environnement.

#### Données

Sources : Réseau hydrologique, modèles d'écoulement et d'accumulation de la Direction générale de la conservation de la biodiversité (DGCB). Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Gouvernement du Québec, Québec.

Délimitation des bassins versants multiéchelles de la Direction de l'expertise hydrique (DEH). Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Gouvernement du Québec, Québec.

Cartographie de l'utilisation du territoire du Québec 2019. Données de SIG [*ArcMap, ESRI Canada*]. Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Gouvernement du Québec, Québec.

Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA), Direction générale du suivi de l'état de l'environnement (DGSEE). Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Gouvernement du Québec, Québec.

Projection cartographique : Conique conforme de Lambert du Québec (EPSG:32198)

Système de référence géodésique : NAD83 (North American Datum 1983)

Structure des données : Vectorielle

Géométrie : Polygone

Étendue géographique : Le Québec

### Fréquence de mise à jour

Annuelle, dernière mise à jour effectuée juin 2023.

### Échelles d'affichage

La couche thématique est visible à toutes les échelles.

### Mise en garde

Les limites des aires de drainage sont produites par traitement géomatique. Elles sont approximatives. Plus la superficie de l'aire est petite, plus l'erreur cartographique augmente.

### Informations descriptives – Table attributaire

- NO\_STATION (alias Numéro de station BQMA) : Numéro d'identification de la station d'échantillonnage de la Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA).
- SUPERF\_QC\_KM2 (alias Superficie drainée à la station au Québec (km<sup>2</sup>)) : Superficie approximative en kilomètres carrés de la portion québécoise, calculée par le logiciel ArcGIS sur la donnée projetée en Conique Équivalente d'Albers du Québec.
- SUPERF\_TOT\_KM2 (alias Superficie totale drainée à la station (km<sup>2</sup>)) : Superficie approximative en kilomètres carrés calculée par le logiciel ArcGIS sur la donnée projetée en Conique Équivalente d'Albers du Québec. Inclut la superficie au Québec et hors Québec, soit la partie au Nouveau-Brunswick, en Ontario ou aux États-Unis.
- FRONTIERE (alias Partie frontalière (NB, ON, EU)) : Permet de discriminer si le bassin a une section hors Québec. Dans ce cas, la superficie totale inclut la superficie au Québec et hors Québec.
- PC\_GRAND\_INTERLIGNE (alias Culture à grand interligne (%)) : Superficie relative en culture à grand interligne de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_INTERLIGNE\_ETROIT (alias Culture à interligne étroit (%)) : Superficie relative en culture à interligne étroit de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_AUTRE\_CULTURE (alias Autre culture (%)) : Superficie relative en autres types de culture de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_FOURRAGE (alias Fourrage (%)) : Superficie relative en fourrages de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_FORET (alias Forêt (%)) : Superficie relative en forêt et arbustaies de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_HUMIDE (alias Milieu humide (%)) : Superficie relative des milieux humides de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_TOURBIERE (alias Tourbière (%)) : Superficie relative en tourbières de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_EAU (alias Eau (%)) : Superficie relative en eau de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_ANTHROPIQUE (alias Anthropique (%)) : Superficie relative d'utilisation anthropique de l'aire de drainage en amont de la station.
- PC\_COUPE\_REGENERATION (alias Coupe et régénération (%)) : Superficie relative

en coupe forestière et régénération de l'aire de drainage en amont de la station.

- PC\_AUTRE (alias Autre (%)) : Superficie relative de l'aire de drainage en amont de la station occupée par un autre type d'utilisation du territoire.
- ANNEE (alias Année de la source) : Année de la compilation de la matrice de l'utilisation du territoire du MELCCFP.

**Table associée – Indice de santé du benthos (dans les cours d'eau à substrat grossier ou à substrat meuble)**

- NO\_STATION (alias Numéro de station BQMA) : Numéro d'identification de la station d'échantillonnage de la Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA).
- ETIQSTATION (alias Étiquette) : Identifiant attribué à la station dans le cadre du Réseau-benthos.
- NM\_RIVIERE (alias Nom du cours d'eau) : Provient de la banque des toponymes de la Commission de toponymie du Québec et de la banque Lac et cours d'eau (LCE).
- DATE\_ENCHAN (alias Date de l'échantillonnage) : Date de la dernière prise d'échantillonnage.
- TYPE\_SUIVI (alias Type de suivi) :
  - Permanent : Les stations permanentes sont échantillonnées toutes les années depuis la création du Réseau de suivi du benthos (RSBenthos) en 2010.
  - Rotatif : Les stations rotatives sont échantillonnées aux cinq ans depuis la création du Réseau de suivi du benthos (RSBenthos) en 2010.
  - Occasionnel : Les stations sont échantillonnées occasionnellement.
- TYPE\_APPRO (alias Type d'approche) : En lien avec la méthode d'échantillonnage.
  - Monohabitat : Approche réalisée dans les cours d'eau à substrat grossier et à écoulement rapide. Les échantillonnages sont faits au niveau des seuils et des plats courants à la station de 100 m. On exclut les habitats plus profonds à très faible courant afin de comparer seulement les habitats les plus productifs, notamment, au plan de la diversité.
  - Multihabitat : Approche réalisée dans les cours d'eau à substrat meuble et à écoulement lent. Les échantillonnages sont faits dans les berges, les débris végétaux et les plantes aquatiques, et ce, proportionnellement selon leur présence à la station de 100 m. Ces trois habitats sont sélectionnés en raison de leur stabilité et de leur productivité. On exclut les autres habitats tels le sable, le limon, l'argile, les algues et les seuils rocheux.
- TYPE\_SUBS (alias Nature du substrat du cours d'eau) :
  - Substrat grossier : Un cours d'eau à substrat grossier a un substrat dominé par du gravier et des roches de grosseurs diverses.
  - Substrat meuble : Un cours d'eau à substrat meuble a un substrat dominé par le sable, le limon, la boue ou l'argile.
- TYPE\_STAT (alias Type de station) :
  - RSBenthos : Réseau de suivi du benthos mis en place en 2010.
  - Rbase 2003/2009 : Suivi du benthos entre 2003 et 2009.
  - Projet spécial : Projets ad-hoc benthos.
- O\_STRAHLER (alias Ordre de Strahler) : Ordre d'écoulement d'un cours d'eau établi selon la méthode de Strahler à partir du réseau hydrologique du Québec. Ainsi le plus petit ruisseau à écoulement permanent sans tributaire qui apparaît sur une carte au 1 : 20 000 est considéré d'ordre 1. Lorsqu'il rencontre un deuxième tributaire d'ordre 1

pour ne former qu'un segment, ce dernier sera d'ordre 2 et ainsi de suite.

- IQH (alias Indice de qualité de l'habitat) : Indice compilant dix paramètres pour lesquels un pointage de 0 à 20 est attribué. Plus le paramètre est optimal, plus la cote est élevée et plus il est pauvre, moins le pointage est élevé. La valeur de l'indice de qualité de l'habitat (IQH) est obtenue en sommant la valeur obtenue pour chaque paramètre. L'IQH a une échelle qui varie de 0 à 200. Cette échelle est ramenée par la suite sur une plage de valeurs entre 0 et 100. Les détails concernant les divers paramètres de l'habitat sont présentés dans Moisan et Pelletier (2011).
  - Dans les cours d'eau à substrat grossier, les dix variables évaluées sont : le substrat benthique et la disponibilité des abris, l'ensablement – envasement, les régimes de vitesse et de profondeur, la sédimentation, le degré de marnage, la modification du cours d'eau (vue d'ensemble vers l'amont), la fréquence des seuils (vue d'ensemble, vers l'amont), la stabilité des berges (vue d'ensemble, vers l'amont), la protection végétale des berges (vue d'ensemble, vers l'amont) et la largeur de la bande végétale (vue d'ensemble, vers l'amont).
  - Dans les cours d'eau à substrat meuble, les dix variables évaluées sont : les habitats aquatiques, le substrat des fosses, la variété des fosses, la sédimentation, le degré de marnage, la modification du cours d'eau (vue d'ensemble, vers l'amont), la stabilité des berges (vue d'ensemble, vers l'amont), la protection végétale des berges (vue d'ensemble, vers l'amont), la largeur de la bande végétale (vue d'ensemble, vers l'amont) et la sinuosité du cours d'eau. La dernière variable, soit la sinuosité du cours d'eau, a été évaluée sur des cartes à l'échelle de 1 : 20 000 sur une distance de 1 km.
- IQBR (alias Indice de qualité de la bande riveraine) : Indice servant à évaluer la condition écologique du milieu riverain. Il est construit à partir de neuf composantes qui ont été pondérées selon le potentiel à remplir les fonctions écologiques en regard de la protection des écosystèmes aquatiques. L'indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) a une échelle qui varie de 17 à 100. La valeur de l'indice estime l'importance de chaque composante à remplir les fonctions écologiques du milieu riverain, à maintenir et à soutenir les populations animales, aquatiques et terrestres dans un état équilibré et propre à celui des milieux naturels. Ces composantes sont toutes exprimées en pourcentage de recouvrement soient par les arbres, les arbustes, les plantes herbacées naturelles, les cultures, le sol nu, les fourrages, les pâturages, les pelouses, les structures artificielles, les coupes forestières (récentes) et les roches ou le roc (socle rocheux).
- TYPE\_ECOUL (alias Type d'écoulement – dominance (%)) : Importance relative exprimée en pourcentage du type d'écoulement. Il en existe trois types : Fosse (zone d'un cours d'eau où le courant est faible et où la profondeur est supérieure aux zones environnantes), Plat courant et plat lentique (zone d'un cours d'eau où la profondeur est uniforme et plutôt faible. C'est une zone de transition entre la fosse et le seuil) et Seuil ou radier (zone peu profonde d'un cours d'eau où le courant est rapide et entravé par des roches ou des morceaux de bois submergés qui produisent une agitation de surface).
- SUBS\_DOM (alias Composition du substrat du cours d'eau – dominance (%)) : Composition du fond du cours d'eau, dont l'importance relative est exprimée en pourcentage selon cinq classes de substrats : Roc (roche mère); blocs (plus de 20 cm de diamètre); galets (entre 2 et 20 cm de diamètre); gravier (entre 0,2 et 2 cm de diamètre); sable (entre 0,02 et 0,2 cm de diamètre); limon et argile (moins de 0,02 cm de diamètre).
- ISBg (alias ISBg) : Indice de santé du benthos pour les cours d'eau à substrat grossier.
- NBTAXg (alias Nombre de taxons (genre) – substrat grossier) : Nombre total de taxons

identifiés principalement au genre.

- NBTAXEPT\_g (alias Nombre de taxons EPT) : Nombre total de taxons appartenant aux Ephemeroptera, Plecoptera et Trichoptera identifiés au genre.
- ABREPT\_Hg (alias Pourcentage d'EPT sans les Hydropsychidae) : Abondance relative des Ephemeroptera, Plecoptera et Trichoptera excluant les Hydropsychidae.
- ABRECHIROg (alias Pourcentage des Chironomidae) : Abondance relative des Chironomidae. Variable de l'ISB<sub>g</sub>.
- ABR2TXDOMg (alias Pourcentage des deux taxons dominants (famille)) : Abondance relative des deux taxons dominants identifiés à la famille.
- HBIg (alias Indice biotique d'Hilsenhoff (genre) – substrat grossier) : Indice biotique d'Hilsenhoff calculé avec les cotes de tolérance au genre.
- ISBm (alias ISB<sub>m</sub>) : Indice de santé du benthos pour les cours d'eau à substrat meuble.
- NBTAX\_m (alias Nombre de taxons (genre) – substrat meuble) : Nombre total de taxons identifiés principalement au genre.
- NBTAXPOETm (alias Nombre de taxons POET) : Nombre total de taxons appartenant aux Plecoptera, Odonata, Ephemeroptera et Trichoptera identifiés au genre.
- ABREPTm (alias Pourcentage d'EPT) : Abondance relative des Ephemeroptera, Plecoptera et Trichoptera.
- ABREINSEm (alias Pourcentage d'insectes) : Abondance relative des insectes.
- ABRTXTOLm (alias Pourcentage des taxons tolérants (genre)) : Abondance relative des taxons tolérants (cotes de tolérance au genre).
- HBIm (alias Indice biotique d'Hilsenhoff (genre) – substrat meuble) : Indice biotique d'Hilsenhoff calculé avec les cotes de tolérance au genre.
- LAT\_GPS (alias Latitude NAD83 (GPS)) : Coordonnées géographiques en degrés décimaux de la station BQMA.
- LONG\_GPS (alias Longitude NAD83 (GPS)) : Coordonnées géographiques en degrés décimaux de la station BQMA.
- NOM\_PRO\_NA (alias Province naturelle) : Première perception du cadre écologique de référence du Québec (CERQ).
- NOM\_REG\_NA (alias Région naturelle) : Deuxième perception du CERQ.
- NOM\_BV\_N1 (alias Bassin versant primaire) : Numéro et nom du bassin hydrographique de niveau 1 où se situe la station de mesure. L'information provient de la banque LCE.
- NOM\_BV\_N2 (alias Bassin versant secondaire) : Numéro et nom du bassin hydrographique de niveau 2 où se situe la station de mesure. L'information provient de la banque LCE.
- ZGIEBV (alias Zone de gestion intégrée de l'eau par bassin versant) : Nom de la zone de gestion intégrée de l'eau par bassin versant dans laquelle se trouve la station de mesure.
- ZGIESL (alias Zone de gestion intégrée de l'eau du Saint-Laurent) : Nom de la zone de gestion intégrée de l'eau du Saint-Laurent dans laquelle se trouve la station de mesure.
- DOCUM (alias Documentation) : Hyperlien vers le rapport scientifique réalisé à partir des données de échantillonnées à la station.